

**Checkliste der Spinnentiere Deutschlands, der Schweiz und Österreichs
(Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Palpigradi).
Vorläufige Version 7. Juli 2000.**

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Araneae					
Atypidae					
Atypus muralis Bertkau, 1890	V	k	kh		
Atypus piceus (Sulzer, 1776)	V	k	2		
Atypus affinis Eichwald, 1830	V	k	kh		
Filistatidae					
Pritha nana (Simon, 1868)			k		
Scytodidae					
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)	V	k	2	1804, ohne Klammern	
Leptonetidae					
Proleptoneta italica (Simon, 1907)			ks		
Pholcidae					
Psilochorus simoni (Berland, 1911)	V	k	N	Physocyclus s.	A: Kritscher (1969)
Spermophora senoculata (Dugès, 1836)			k		
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)	V	k	2		
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)	V	k	2		
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)	N	k			D: Jäger (1995b), Jäger & Kreuels (1995)
Segestriidae					
Segestria florentina (Rossi, 1790)	V	k			
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)	V	k	2		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Segestria bavarica C.L. Koch, 1843	V	k	2		
Dysderidae					
Dysdera ninnii Canestrini, 1868	V	k	kh		
Harpactocrates drassoides (Simon, 1882)			k		
Harpactea thaleri Alicata, 1966			k		
Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838)	V	k	2	1839	
Harpactea lepida (C.L. Koch, 1838)	V	k	2		
Harpactea grisea (Canestrini, 1868)			k	ks	
Dysdera hungarica Kulczynski, 1897				2	
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)	V	k	2		
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)	V	k	kh		
Dysdera crocata C.L. Koch, 1838	V	k		D. crocota	
Dasumia taeniifera Thorell, 1875			k		
Dasumia canestrinii (L. Koch, 1876)				kh	
Dysdera longirostris Doblika, 1853				kh	
Oonopidae					
Oonops pulcher Templeton, 1835	V	k	2		
Tapinesthis inermis (Simon, 1882)	V	k	2		
Oonops domesticus Dalmas, 1916	V	k			
Ischnothyreus velox Jackson, 1908	V				
Gamasomorpha loricatula (Roewer, 1942)	V				
Mimetidae					
Ero cambridgei Kulczynski, 1911	V		N		A: Zulka et al. (1997)
Ero furcata (Villers, 1789)	V	k	2		
Ero tuberculata (De Geer, 1778)	V	k	kh		
Ero aphana (Walckenaer, 1802)	V	k			

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Eresidae					
Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)	V	k	kh	E. niger	
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778)	V				
Uloboridae					
Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834)	V	k	2		
Uloborus plumipes Lucas, 1846	V	N	N		CH: Jonsson (1993), A: Horak & Kropf (1999)
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806	V	k	2	mit Klammern	
Nesticidae					
Nesticus eremita Simon, 1879	V	k	T		
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)	V	k	2	1758	
Nesticus idriacus Roewer, 1931				T	
Theridiidae					
Robertus truncorum (L. Koch, 1872)	V	k	2		
Steatoda phalerata (Panzer, 1801)	V	k	2		
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805)		k	T	1806	
Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)	V		2		
Steatoda castanea (Clerck, 1757)	V		2		
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)	V	k	2		
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)	V	k	2		
Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)	V	k	2	Theridion s.	
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	ks	1870, Theridion instabile	
Robertus unguilatus Vogelsanger, 1944	V	k	2		
Theonoe sola Thaler & Steinberger, 1988	V		2		
Robertus scoticus Jackson, 1914	V	k	2		
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	2		
Robertus mediterraneus Eskov, 1987			k		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Robertus lyrifer Holm, 1939				T	
Robertus lividus (Blackwall, 1836)	V	k	2		
Robertus kuehnae Bauchhenß & Uhlenhaut, 1993	V	2	2	R. grasshoffi auct.	
Robertus insignis O. P.-Cambridge, 1907	V				
Robertus heydemanni Wieghele, 1965	V		T		
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873)	V	k	2	Theridion bellicosum	
Theridion melanurum Hahn, 1831	V	k			
Robertus grasshoffi Wunderlich, 1973	V				
Theridion wiehlei Schenkel, 1938	V				
Theridion varians Hahn, 1833	V	k	2		
Theridion uhligi Martin, 1974	V				
Theridion tinctum (Walckenaer, 1802)	V	k	2		
Theridion refugum Drensky, 1929			2	T. wiehlei auct.	
Theridion pictum (Walckenaer, 1802)	V	k	2		
Theridion petraeum L. Koch, 1872			k	2	
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)	V	k	T		
Theridion mystaceum L. Koch, 1870	V	k	2		
Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879)	V	k	2		
Theridion impressum L. Koch, 1881	V	k	2		
Theridion hemerobium Simon, 1914	V	2		T. hemerobius	
Theridion hannoniae Denis, 1944	V				
Theridion familiare O. P.-Cambridge, 1871	V	k			
Theridion conigerum Simon, 1914	V		2	mit Klammern	
Theridion boesenbergi Strand, 1904	V	k	2		
Theridion blackwalli O. P.-Cambridge, 1871	V	k	2		
Theridion betteni Wieghele, 1960	V	k	2		
Theridion pinastri L. Koch, 1872	V	k	2		
Theridion nigrovariegatum Simon, 1873	V	k	2		
Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802)	V				
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1879)	N				D: Finch (1999)

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)	V	k	2		
<i>Dipoena inornata</i> (O. P.-Cambridge, 1861)	V	k	2		
<i>Dipoena erythropus</i> (Simon, 1881)	V	k			
<i>Dipoena coracina</i> (C.L. Koch, 1837)	V	k	T		
<i>Achaearanea tepidiorum</i> (C.L. Koch, 1841)	V	k	2		
<i>Crustulina sticta</i> (O. P.-Cambridge, 1861)	V		T		
<i>Coleosoma floridanum</i> Banks, 1900	N	N		nur in Gewächshäusern etc.	CH: Knoflach (1999), D: Broen et al. (1998)
<i>Dipoena prona</i> (Menge, 1868)	V	k	2		
<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)	V	k	T		
<i>Dipoena braccata</i> (C.L. Koch, 1841)	V	k	T		
<i>Anelosimus aulicus</i> (C.L. Koch, 1838)	V				
<i>Achaearanea tabulata</i> Levi, 1980	V		2		
<i>Achaearanea simulans</i> (Thorell, 1875)	V	k	2		
<i>Achaearanea riparia</i> (Blackwall, 1834)	V	k	2		
<i>Achaearanea ohlerti</i> (Thorell, 1870)	V	k	2	Theridion o. ohlerti; Theridion o.	
<i>Achaearanea lunata</i> (Clerck, 1757)	V	k	2		
<i>Robertus arundineti</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	2		
<i>Theridion sisyphium</i> (Clerck, 1757)	V	k	2		
<i>Carniella brignolii</i> Thaler & Steinberger, 1988	V		T		
<i>Euryopis laeta</i> (Westring, 1861)	V	k		1862, 1831 (lapsus)	
<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)	V	k	2		
<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)	V	k	2	Theridion p.	
<i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1879)	V	k	T	Theridion s.	
<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	V	k	2	Theridion bimaculatum	
<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)	V	k	2		
<i>Euryopis quinqueguttata</i> Thorell, 1875	V	k	T		
<i>Dipoena torva</i> (Thorell, 1875)	V	k	2		
<i>Euryopis flavomaculata</i> (C.L. Koch, 1836)	V	k	2		
<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	V	k	2		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Episinus maculipes</i> Cavanna, 1876	V		2		
<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)	V	k	2		
<i>Enoplognatha caricis</i> (Fickert, 1876)	V	k	T	E. tecta	
<i>Enoplognatha testacea</i> Simon, 1884	V				
<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982	V	k	2		
<i>Enoplognatha militaris</i> Wunderlich, 1995	N				D: Wunderlich (1995a)
<i>Lasaeola tristis</i> (Hahn, 1833)	V	k	2	Dipoena t.	
<i>Enoplognatha serratosignata</i> (L. Koch, 1879)			k	E. jacksoni	
<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	V	k	2		
<i>Enoplognatha oelandica</i> (Thorell, 1875)	V	2			
<i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875)	V	k	T		
<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)	V	k	2		
Theridiosomatidae					
<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1877)	V	k	N		A: Thaler (1993a)
Anapidae					
<i>Comaroma simoni</i> Bertkau, 1889	V	k	T	vorher bei Theridiidae, C. simonii	
Mysmenidae					
<i>Mysmenella jobi</i> (Kraus, 1967)	V	k	T		
<i>Trogloneta granulum</i> Simon, 1922			T		
Linyphiidae					
<i>Parapelecopsis nemoralis</i> (Blackwall, 1841)	V	k	kh	Pelecopis n.	
<i>Pelecopis alpica</i> Thaler, 1991			6	P. alpicus	
<i>Pelecopis elongata</i> (Wider, 1834)	V	k	6		
<i>Parapelecopsis nemoraliooides</i> (O. P.-Cambridge, 1884)	V			Pelecopis n.	
<i>Panamomops affinis</i> Miller & Kratochvil, 1939	V		6		
<i>Panamomops tauricornis</i> (Simon, 1881)	V	k	6		
<i>Panamomops sulcifrons</i> (Wider, 1834)	V	k	N		A: Breuss (1996)

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Panamomops palmgreni Thaler, 1973			k	6	
Panamomops mengei Simon, 1926	V		k		
Panamomops latifrons Miller, 1959			N	P. beieri	A: Kritscher (1968)
Panamomops inconspicuus (Miller & Valesova, 1964)	V	k	N	P. inconspicua	A: Malicky (1972b)
Panamomops fagei Miller & Kratochvil, 1939	V				
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879)	V	k	5		
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881)	V			Lepthyphantes a.	
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872)	V	k	5		
Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)	V		5		
Oreonetides glacialis (L. Koch, 1872)	V	k	5	Montitextrix g.	
Oedothorax retusus (Westring, 1851)	V	k	6		
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)	V	k	6		
Oedothorax gibbifer (Kulczynski, 1882)			k	6	
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)	V	k	6		
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)	V	k	6		
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853)	V	k	6		
Pelecopsis mengei (Simon, 1884)	V	k	6		
Neriene radiata (Walckenaer, 1842)	V	k	5	1841	
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	5		
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1872)	V	k			
Porrhomma egeria Simon, 1884	V	k	5		
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971)	V	k	6		
Prinerigone vagans (Audouin, 1826)	V	2	ks		
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872)	V	2			
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)	V	k	5		
Porrhomma pallidum Jackson, 1913	V	k	5		
Minicia marginella (Wider, 1834)	V	k	6		
Porrhomma myops Simon, 1884	N		5		D: Weiß (1997)
Neriene peltata (Wider, 1834)	V	k	5		
Porrhomma montanum Jackson, 1913	V			P. hebescens	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Porrhomma microps</i> (Roewer, 1931)	V			kh	
<i>Porrhomma microphthalmum</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k		ks	
<i>Porrhomma microcavense</i> Wunderlich, 1990	V			N	A: Steinberger & Thaler (1994)
<i>Porrhomma moravicum</i> Miller & Kratochvil, 1940	N				D: Malt et al. (1998)
<i>Porrhomma errans</i> (Blackwall, 1841)	V	k			
<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)	V	k	6		
<i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1851)	V	k	5	1861	
<i>Porrhomma campbelli</i> F.O. P.-Cambridge, 1894	V	k	5		
<i>Porrhomma cambridgei</i> Merrett, 1994	V	2			
<i>Poeciloneta variegata</i> (Blackwall, 1841)	V	k	5	<i>P. globosa</i>	
<i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)	V	k	6		
<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953	V	k	6		
<i>Pocadicnemis carpatica</i> (Chyzer, 1894)	V	k	N		A: Zulka (1992)
<i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C.L. Koch, 1836)	V	k	5		
<i>Piniphantes pinicola</i> (Simon, 1884)	V	k	5	<i>Lepthyphantes p.</i>	
<i>Peponocranium praeceps</i> Miller, 1943	V				
<i>Peponocranium orbiculatum</i> (O. P.-Cambridge, 1882)	V	k	ks		
<i>Peponocranium ludicum</i> (O. P.-Cambridge, 1861)	V				
<i>Pelecopsis radicicola</i> (L. Koch, 1872)	V	k	6	1875	
<i>Porrhomma lativelum</i> Tretzel, 1956	V	k	5	<i>P. lativela</i>	
<i>Meioneta ressli</i> Wunderlich, 1973	N	k	5		D: Muster (1999)
<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)	V	k	6		
<i>Micrargus georgescuae</i> Millidge, 1976	V	k	6		
<i>Micrargus apertus</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V		6		
<i>Micrargus alpinus</i> Relys & Weiss, 1997			6		
<i>Metopobactrus schenkeli</i> Thaler, 1976			k		
<i>Metopobactrus rayi</i> (Simon, 1881)	V				
<i>Metopobactrus prominulus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	V	k	6		
<i>Metopobactrus nodicornis</i> Schenkel, 1927			k	6	
<i>Metopobactrus nadigi</i> Thaler, 1976			k	6	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Metapanamomops kaestneri</i> (Wiehle, 1961)	V				
<i>Meioneta simplicitarsis</i> (Simon, 1884)	V	k	N		A: Thaler (1983)
<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)	V	k	6		
<i>Meioneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)	V	k	5		
<i>Microctenonyx subitaneus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k	6		
<i>Meioneta orites</i> (Thorell, 1875)			k	ks	
<i>Meioneta nigripes</i> (Simon, 1884)			k	5	
<i>Meioneta mossica</i> Schikora, 1993	V				
<i>Meioneta mollis</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	5		
<i>Meioneta innotabilis</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	V	k	5		
<i>Meioneta gulosa</i> (L. Koch, 1869)	V	k	5		
<i>Meioneta fuscipalpa</i> (C.L. Koch, 1836)	V	k	kh	M. fuscipalpis, M. fuscipalpus	
<i>Meioneta equestris</i> (L. Koch, 1881)	V	k	5		
<i>Meioneta alpica</i> (Tanasevitch, 2000)			N	Agyneta a.	A: Tanasevitch (2000)
<i>Meioneta affinis</i> (Kulczynski, 1898)	V	k	5	M. beata	
<i>Pseudomaro aenigmaticus</i> Denis, 1966	V	2	N		A: Thaler (1991)
<i>Troglohyphantes caligatus</i> Pesarini, 1989			k		
<i>Meioneta saxatilis</i> (Blackwall, 1844)	V	k	kh		
<i>Mughiphantes handschini</i> (Schenkel, 1919)			k	Lepthyphantes h.	
<i>Neriene hammeni</i> (van Helsdingen, 1963)	V				
<i>Neriene furtiva</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k		1870	
<i>Neriene emphana</i> (Walckenaer, 1842)	V	k	5	1837, 1841	
<i>Neriene clathrata</i> (Sundevall, 1830)	V	k	5	1829	
<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer, 1842)	V	k	kh	Cnephalocotes s., 1837, 1841	
<i>Mycula mossakowskii</i> Schikora, 1994	V				
<i>Mughiphantes variabilis</i> (Kulczynski, 1887)	V	k	5	Lepthyphantes t.	
<i>Mughiphantes triglavensis</i> (Miller & Polenec, 1975)			ks	Lepthyphantes t.	
<i>Mughiphantes styriacus</i> (Thaler, 1984)			kh	Lepthyphantes s.	
<i>Mughiphantes severus</i> (Thaler, 1990)			5	Lepthyphantes s.	
<i>Mughiphantes rupium</i> (Thaler, 1984)			kh	Lepthyphantes r.	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Mughiphantes pulcheroides</i> (Wunderlich, 1985)			k	Lepthyphantes p.	
<i>Micrargus laudatus</i> (O. P.-Cambridge, 1881)			k	Anmerkung: kein gesicherter Nachweis aus D bekannt	
<i>Mughiphantes mughi</i> (Fickert, 1875)	V	k	5	Lepthyphantes m.	
<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)	V	k	6		
<i>Mughiphantes baebleri</i> (Lessert, 1910)			k	5	Lepthyphantes b.
<i>Mughiphantes armatus</i> (Kulczynski, 1904)			k	5	1905, Lepthyphantes a.
<i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836)	V	k	N		A: Breuss (1996)
<i>Monocephalus castaneipes</i> (Simon, 1884)	V	k	6		
<i>Moebelia penicillata</i> (Westring, 1851)	V	k	6		
<i>Mioxena blanda</i> (Simon, 1884)	V	k	6		
<i>Minyriolus medusa</i> (Simon, 1881)			6	Pelecopsis m.	
<i>Midia midas</i> (Simon, 1884)	V			Lepthyphantes m.	
<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)	V	k	5		
<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)	V	k	5	1829	
<i>Microlinyphia impigra</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	ks		
<i>Neriene montana</i> (Clerck, 1757)	V	k	5		
<i>Mughiphantes pulcher</i> (Kulczynski, 1881)	V	k	5	Lepthyphantes p.	
<i>Troglohyphantes karawankorum</i> Deeleman-Reinhold, 1978				ks	
<i>Troxochrus nasutus</i> Schenkel, 1925	V	k	6		
<i>Troglohyphantes wiehlei</i> Miller & Polenec, 1975				ks	
<i>Troglohyphantes typhonetiformis</i> Absolon & Kratochvil, 1932				ks	
<i>Troglohyphantes tirolensis</i> Schenkel, 1950				5	
<i>Troglohyphantes thaleri</i> Miller & Polenec, 1975				kh	
<i>Troglohyphantes tauriscus</i> Thaler, 1982				kh	
<i>Troglohyphantes subalpinus</i> Thaler, 1967				5	
<i>Troglohyphantes sordellii</i> (Pavesi, 1875)			k		
<i>Troglohyphantes sbordonii</i> Brignoli, 1975				ks	
<i>Troglohyphantes novicordis</i> Thaler, 1978				kh	
<i>Troglohyphantes noricus</i> (Thaler & Polenec, 1974)	V			kh	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Trichoncus affinis</i> Kulczynski, 1894	V	k	ks		
<i>Troglohyphantes latzeli</i> Thaler, 1986			ks		
<i>Typhochrestus inflatus</i> Thaler, 1980		k	6		
<i>Troglohyphantes helsdingeni</i> Deeleman-Reinhold, 1978			ks		
<i>Troglohyphantes excavatus</i> Fage, 1919			ks		
<i>Mansuphantes fragilis</i> (Thorell, 1875)	V	k	5	Lepthyphantes f.	
<i>Trichopterna thorelli</i> (Westring, 1861)	V	k	6	1862	
<i>Megalepthyphantes pseudocollinus</i> Saaristo, 1997			N	Lepthyphantes collinus ad part.	A: Saaristo (1997)
<i>Trichoncus vasconicus</i> Denis, 1944			6	Unsicherheit der Zuordnung bzw. möglichen Synonymie mit anderen Arten der Gattung (vgl. Thaler 1999)	
<i>Trichoncus sordidus</i> Simon, 1884	V				
<i>Trichoncus simoni</i> (Lessert, 1904)	V	k	6	Tapinocyboides s.	
<i>Trichoncus saxicola</i> (O. P.-Cambridge, 1861)	V	1	N	Maurer & Hänggi (1990): sub <i>T. hackmani</i>	A: Nemenz (1958)
<i>Trichoncus helveticus</i> Denis, 1965			k		
<i>Trichoncus hackmani</i> Millidge, 1956	V		N	1955	A: Malicky (1972b)
<i>Trichopterna cito</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	V	k	6		
<i>Troglohyphantes lucifuga</i> (Simon, 1884)			k	<i>T. lucifugus lucifugus</i> , <i>T. lucifugus ferrinii</i> (vgl. Platnick 1993)	
<i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge, 1871)	V	k	6	1869	
<i>Wiehlenarius tirolensis</i> (Schenkel, 1939)			k	6	<i>Asthenargus</i> (?) t.
<i>Wiehlea calcarifera</i> (Simon, 1884)	V				
<i>Walckenaeria vigilax</i> (Blackwall, 1853)	V	k	6		
<i>Walckenaeria unicornis</i> O. P.-Cambridge, 1861	V	k	6		
<i>Walckenaeria stylifrons</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k	ks		
<i>Walckenaeria simplex</i> Chyzer, 1894			kh		
<i>Walckenaeria obtusa</i> Blackwall, 1836	V	k	6		
<i>Walckenaeria nudipalpis</i> (Westring, 1851)	V	k	6		
<i>Walckenaeria nodosa</i> O. P.-Cambridge, 1873	V	k	kh		
<i>Walckenaeria monoceros</i> (Wider, 1834)	V	k	6		
<i>Walckenaeria mitrata</i> (Menge, 1868)	V	k	6		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Walckenaeria languida (Simon, 1914)			k	6 ohne Klammern	
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)	V		k	6 T. cirrifrons bei Platnick (2000 Internet) als gesonderte Art geführt, der Status ist nach Thaler (1999) noch nicht bestimmt	
Walckenaeria incisa (O. P.-Cambridge, 1871)	V		k		
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1872)	V		k	N	A: Malicky (1972b)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)	V		k	6	
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833	V		k	6 mit Klammern	
Walckenaeria cucullata (C.L. Koch, 1836)	V		k	6	
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875)	V		k	6	
Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882)			k	6	
Walckenaeria capito (Westring, 1861)	V		k	6	
Walckenaeria atrotibialis O. P.-Cambridge, 1878	V		k	6 mit Klammern	
Walckenaeria antica (Wider, 1834)	V		k	6	
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)	V		k	6	
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833	V		k	6	
Typhochrestus simoni Lessert, 1907	V		k		
Trichoncoides piscator (Simon, 1884)				N	A: Thaler & Steiner (1975)
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872)	V		k	ks	
Silometopus curtus (Simon, 1881)	V			S. ambiguus auct.	
Syedra gracilis (Menge, 1869)	V		k	5	
Syedra apetlonensis Wunderlich, 1992				N	A: Wunderlich (1992)
Styloctetor stativus (Simon, 1881)	V		k	6 Ceratinopsis stativa	
Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1872)	V		k	Ceratinopsis romana	
Styloctetor austerus (L. Koch, 1884)	V		k	6 Ceratinopsis austera	
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)	V		k	5	
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879)	N		k	5	D: Muster (1999)
Siscus apertus (Holm, 1939)			k	6	
Sintula corniger (Blackwall, 1856)	V		k	5 S. cornigera	
Silometopus rosemariae Wunderlich, 1969			k	6	
Silometopus reussi (Thorell, 1871)	V		k	6	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Trichoncus auritus</i> (L. Koch, 1869)	N	k	6	T. kulczynskii	D: Junker & Ratschker (1999)
<i>Silometopus elegans</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	V	k	6		
<i>Tallusia vindobonensis</i> (Kulczynski, 1898)		1	N		A: Nemenz (1958)
<i>Silometopus bonessi</i> Casemir, 1970	V	2	N		A: Malicky (1972b)
<i>Semljicola faustus</i> (O. P.-Cambridge, 1900)	V	k		Latithorax f.	
<i>Scotinotylus evansi</i> (O. P.-Cambridge, 1894)		k	6		
<i>Scotinotylus clavatus</i> (Schenkel, 1927)		k	6		
<i>Scotinotylus antennatus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k	6		
<i>Scotinotylus alpigena</i> (L. Koch, 1869)		k	6	S. alpigenus	
<i>Scotargus pilosus</i> Simon, 1913	V	k	5		
<i>Sciastes carli</i> (Lessert, 1907)		k	6		
<i>Savignia frontata</i> Blackwall, 1833	V	k		mit Klammern	
<i>Satilatlas britteni</i> (Jackson, 1913)	V	k		1912	
<i>Saloca diceros</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	6		
<i>Saaristoa firma</i> (O. P.-Cambridge, 1900)	V	k	5	1901, 1905	
<i>Silometopus incurvatus</i> (O. P.-Cambridge, 1873)	V				
<i>Tenuiphantes cristatus</i> (Menge, 1866)	V	k	5	Lepthyphantes c.	
<i>Trematocephalus cristatus</i> (Wider, 1834)	V	k	6		
<i>Tmeticus affinis</i> (Blackwall, 1855)	V				
<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)	V	k	6		
<i>Tiso aestivus</i> (L. Koch, 1872)	V	k	6		
<i>Thyreosthenius parasiticus</i> (Westring, 1851)	V	k	6		
<i>Thyreosthenius biovatus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k	6		
<i>Theonina cornix</i> (Simon, 1881)	V	k	5		
<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)	V	k	N	Lepthyphantes z.	A: Breuss (1994)
<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)	V	k	5	Lepthyphantes t.	
<i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider, 1834)	V	k	5	Lepthyphantes t.	
<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski, 1887)	V	k	5	Lepthyphantes m.	
<i>Tenuiphantes jacksonoides</i> (van Helsingden, 1977)	V	k	5	Lepthyphantes j.	
<i>Syedra myrmicarum</i> (Kulczynski, 1882)	V	k	5	1883	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)	V	k	5	Lepthyphantes f.	
<i>Tallusia experta</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	5		
<i>Tenuiphantes alacris</i> (Blackwall, 1853)	V	k	5	Lepthyphantes a.	
<i>Taranucnus setosus</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	V				
<i>Tapinopa longidens</i> (Wider, 1834)	V	k	5		
<i>Tapinocyboides pygmaeus</i> (Menge, 1869)	V	k	6		
<i>Tapinocyba praecox</i> (O. P.-Cambridge, 1873)	V	1	kh		
<i>Tapinocyba pallens</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	V	k	6		
<i>Tapinocyba maureri</i> Thaler, 1991			1		
<i>Tapinocyba insecta</i> (L. Koch, 1869)	V	k	6		
<i>Tapinocyba biscissa</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	V				
<i>Tapinocyba affinis orientalis</i> Millidge, 1979			6		
<i>Tapinocyba affinis</i> Lessert, 1907	V	k	kh	mit Klammern	
<i>Saaristoa abnormis</i> (Blackwall, 1841)	V	k	N	Oreonetides a.	A: Kritscher (1972)
<i>Tenuiphantes jacksoni</i> (Schenkel, 1925)		k		Lepthyphantes j.	
<i>Ceratinella major</i> Kulczynski, 1894	V		kh		
<i>Dicymbium tibiale</i> (Blackwall, 1836)	V	k	6		
<i>Dicymbium nigrum brevisetosum</i> Locket, 1962	V	k	6	D. nigrum "forma" brevisetosum, D. brevisetosum	
<i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)	V	k	kh		
<i>Diastanillus pecuarius</i> (Simon, 1884)			6		
<i>Dactylopisthes digiticeps</i> (Simon, 1881)			N		A: Kritscher (1958)
<i>Cresmatoneta mutinensis</i> (Canestrini, 1868)		k			
<i>Collinsia inerrans</i> (O. P.-Cambridge, 1885)	V	k	6	1884, Milleriana i.; C. submissa	
<i>Collinsia distincta</i> (Simon, 1884)	V		6		
<i>Collinsia caliginosa nemenziana</i> Thaler, 1980			ks	C. nemenziana	
<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)	V	k	6		
<i>Cinetata gradata</i> (Simon, 1881)	V	k	6	Cineta g.	
<i>Centromerus prudens</i> (O. P.-Cambridge, 1873)	V	k			
<i>Ceratinella scabrosa</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	6		
<i>Diplocentria rectangulata</i> (Emerton, 1915)	V	k	6	Microcentria r.	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Ceratinella brevis (Wider, 1834)	V	k	6		
Ceratinella brevipes (Westring, 1851)	V	k	6		
Centrophantes roeweri (Wiehle, 1961)			ks		
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830)	V	k	5	Lepthyphantes n.	
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)	V	k	5		
Mansuphantes pseudoarciger (Wunderlich, 1985)		k		Lepthyphantes p.	
Centromerus subcaecus Kulczynski, 1914	V		5	C. sp. prope subcaecus	
Centromerus subalpinus Lessert, 1907	V	k	5		
Centromerus silvicola (Kulczynski, 1887)	V	k	5	C. similis auct.	
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k			
Centromerus semiater (L. Koch, 1879)	V	k	N	C. incultus	A: Steinberger & Meyer (1995)
Eperigone eschatologica (Crosby, 1924)	N				D: Jäger & Kreuels (1995), Klein et al. (1995)
Ceratinella wideri (Thorell, 1871)	V				
Diplocephalus protuberans (O. P.-Cambridge, 1875)	V	1	6		
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1902	V				
Entelecara media Kulczynski, 1887		k	6	Anmerkung: alpine Art, kein gesicherter Nachweis aus D	
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)	V	k			
Entelecara erythropus (Westring, 1851)	V	k	6		
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879)	V	k	6		
Entelecara berolinensis (Wunderlich, 1969)	V				
Entelecara acuminata (Wider, 1834)	V	k	6		
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873)	V	k	ks	Thorell	
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)	V	k	5	1832	
Donacochara speciosa (Thorell, 1875)	V	k	ks		
Dismodicus elevatus (C.L. Koch, 1838)	V	k	6		
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)	V	k	6		
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882)	V	k	6		
Diplocephalus rostratus Schenkel, 1934			6		
Diplocentria mediocris (Simon, 1884)	V		6		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Diplocephalus picinus</i> (Blackwall, 1841)	V	k	6		
<i>Diplocephalus permixtus</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	6		
<i>Diplocephalus pavesii</i> Pesarini, 1996		1		D. aff. procer (vgl. Hänggi 1999)	
<i>Diplocephalus lusiscus</i> (Simon, 1872)	V				
<i>Diplocephalus latifrons</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	V	k	6		
<i>Diplocephalus helleri</i> (L. Koch, 1869)	V	k	6	D. "foraminifer" aus dem Wallis (vgl. Hänggi 1999)	
<i>Diplocephalus dentatus</i> Tullgren, 1955	V	2	ks		
<i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)	V	k	6		
<i>Diplocephalus crassilobus</i> (Simon, 1884)		2	ks	D. crassiloba; D. "foraminifer" aus dem Tessin (vgl. Hänggi 1999)	
<i>Diplocephalus connatus</i> Bertkau, 1889	V				
<i>Diplocephalus alpinus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)		k	6	D. connectens	
<i>Centromerus piccolo</i> Weiß, 1996	V			1995	
<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)	V	k	5		
<i>Allomengea scopigera</i> (Grube, 1859)	V	k			
<i>Baryphyma trifrons</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	V				
<i>Baryphyma pratense</i> (Blackwall, 1861)	V	k			
<i>Baryphyma maritimum</i> (Crocker & Parker, 1970)	V				
<i>Baryphyma duffeyi</i> (Millidge, 1954)	V				
<i>Asthenargus perforatus</i> Schenkel, 1929	V	k	6		
<i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884)	V	k	6		
<i>Asthenargus helveticus</i> Schenkel, 1936	V	k	6		
<i>Asthenargus bracianus</i> Miller, 1938			N		A: Thaler (1991)
<i>Araeoncus humilis</i> (Blackwall, 1841)	V	k	6		
<i>Araeoncus crassiceps</i> (Westring, 1861)	V	k	6	1862	
<i>Araeoncus anguineus</i> (L. Koch, 1869)	V	k	6		
<i>Centromerus sellarius</i> (Simon, 1884)	V	k	5		
<i>Allomengea vidua</i> (L. Koch, 1879)	V	k			
<i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851)	V	k	5		
<i>Agyneta subtilis</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	V	k	5		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Agyneta ramosa Jackson, 1912	V	k	5		
Agyneta decora (O. P.-Cambridge, 1871)	V				
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863)	V	k	5		
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1902)	V	k	5		
Agyneta arietans (O. P.-Cambridge, 1872)	V				
Agnyphantes tripartitus (Miller & Svaton, 1978)	V		N	Lepthyphantes t., Lepthyphantes monticola ad part.	A: Thaler & Buchar (1993)
Agnyphantes monticola (Kulczynski, 1881)	V	k	5	Lepthyphantes m.	
Agnyphantes angulipalpis (Westring, 1851)	V	k	kh	Lepthyphantes a.	
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1872)	V	k	6		
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)	V	k	6		
Abacoproeces molestus Thaler, 1973			6		
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882)	V		5		
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916)	V	k	6		
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912)	V	k	N		A: Thaler (1983)
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k	kh		
Centromerus obscurus Bösenberg, 1902			N		A: Thaler (1983)
Centromerus minutissimus Merrett & Powell, 1993	N				D: Sacher & Breinl (1999)
Centromerus levitarsis (Simon, 1884)	V	k	ks		
Centromerus leruthi Fage, 1933	V	k	5		
Centromerus incilium (L. Koch, 1881)	V	k	5		
Centromerus dilutus (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k			
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872)	V	k	5		
Centromerus capucinus (Simon, 1884)	V	2	N		A: Malicky (1972a)
Centromerus brevivulvatus Dahl, 1912	V	k	5	C. aequalis auct.	
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873)	V	k	5		
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	5		
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)	V	k	5		
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)	V	k	5		
Carorita paludosa Duffey, 1971	V				

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Carorita limnaea</i> (Crosby & Bishop, 1927)	V				
<i>Caracladus leberti</i> (Roewer, 1942)		k	6		
<i>Caracladus avicula</i> (L. Koch, 1869)	V	k	6	<i>C. aviculus</i>	
<i>Bolyphantes luteolus</i> (Blackwall, 1833)	V	k	5		
<i>Bolyphantes index</i> (Thorell, 1856)	V	k	5		
<i>Bolyphantes alticeps</i> (Sundevall, 1833)	V	k	5	1832	
<i>Bathyphantes simillimus</i> (L. Koch, 1879)	V			<i>B. eumenis</i> auct.	
<i>Bathyphantes similis</i> Kulczynski, 1894	V	k	5		
<i>Bathyphantes setiger</i> F.O. P.-Cambridge, 1894	V	1	5		
<i>Bathyphantes parvulus</i> (Westring, 1851)	V	k			
<i>Centromerus unidentatus</i> Miller, 1958	N				D: Blick & Hendricks (1995)
<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)	V	k			
<i>Lepthyphantes expunctus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k	5		
<i>Jacksonella falconeri</i> (Jackson, 1908)	V	k	6		
<i>Lepthyphantes pilichi</i> Kulczynski, 1915				kh	
<i>Lepthyphantes pallidus</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	5	<i>L. pallidus pallidus</i>	
<i>Lepthyphantes obscurus</i> (Blackwall, 1841)	V	k	5		
<i>Lepthyphantes notabilis</i> Kulczynski, 1887	V	k	5		
<i>Lepthyphantes nodifer</i> Simon, 1884	V	k	5		
<i>Lepthyphantes nanus</i> Kulczynski, 1898				N	A: Malicky (1972a), Saa/Tan: Canariphantes
<i>Lepthyphantes montanus</i> Kulczynski, 1898	V		5	mit Klammern	
<i>Lepthyphantes monachus</i> Simon, 1884		k			
<i>Lepthyphantes minutus</i> (Blackwall, 1833)	V	k	5		
<i>Lepthyphantes leprosus</i> (Ohlert, 1865)	V	k	5		
<i>Leptothrix hardyi</i> (Blackwall, 1850)	V				
<i>Lepthyphantes insignis</i> O. P.-Cambridge, 1913	V	2	5	mit Klammern	
<i>Lessertia dentichelis</i> (Simon, 1884)	V	2			
<i>Lepthyphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853)	V				
<i>Lepthyphantes crucifer</i> (Menge, 1866)	V	k	5	<i>Bolyphantes c.</i>	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Leptyphantes cornutus</i> Schenkel, 1927		k	5		
<i>Leptyphantes beckeri</i> Wunderlich, 1973	V				
<i>Leptyphantes arenicola</i> Denis, 1964			2		
<i>Leptyphantes antroniensis</i> Schenkel, 1933	N	k	5		D: Muster (1999), Sacher (1999)
<i>Lasiargus hirsutus</i> (Menge, 1869)	V		ks		
<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)	V	k	5		
<i>Kratochviliella bicapitata</i> Miller, 1938	V		N		A: Steinberger & Thaler (1994)
<i>Kaestneria pullata</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	V	k	N		A: Thaler (1983)
<i>Kaestneria dorsalis</i> (Wider, 1834)	V	k	5		
<i>Janetschekia monodon</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	V	k	6		
<i>Leptyphantes keyserlingi</i> (Ausserer, 1867)	V	k	5		
<i>Maro lehtineni</i> Saaristo, 1971	V		5		
<i>Megaleptyphantes collinus</i> (L. Koch, 1872)	V	k	5	<i>Leptyphantes c.</i>	
<i>Mecynargus paetus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k	6	<i>Mecynargus p.</i>	
<i>Mecynargus morulus</i> (O. P.-Cambridge, 1873)	V		6		
<i>Mecynargus foveatus</i> (Dahl, 1912)	V	1	6		
<i>Mecynargus brocchus</i> (L. Koch, 1872)		k	6	1873, <i>Mecynargus b.</i>	
<i>Mecopisthes silus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	V	k	6		
<i>Centromerus succinus</i> (Simon, 1884)			k		
<i>Mecopisthes latinus</i> Millidge, 1978			k		
<i>Eperigone trilobata</i> (Emerton, 1882)	V	k			
<i>Maso gallicus</i> Simon, 1894	V	k			
<i>Maro sublestus</i> Falconer, 1915	V	k			
<i>Leptorhoptrum robustum</i> (Westring, 1851)	V	k	5		
<i>Maro lepidus</i> Casemir, 1961	V	2	ks		
<i>Maso sundevallii</i> (Westring, 1851)	V	k	kh		
<i>Mansuphantes simoni</i> (Kulczynski, 1894)		k		<i>Leptyphantes s.</i>	
<i>Mansuphantes mansuetus</i> (Thorell, 1875)	V	k	5	<i>Leptyphantes m.</i>	
<i>Mansuphantes aridus</i> (Thorell, 1875)		k	5	<i>Leptyphantes a.</i>	
<i>Mansuphantes arciger</i> (Kulczynski, 1882)	V			<i>Leptyphantes a.</i>	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Macrargus rufus</i> (Wider, 1834)	V	k	5		
<i>Macrargus carpenteri</i> (O. P.-Cambridge, 1894)	V	k	5		
<i>Lophomma punctatum</i> (Blackwall, 1841)	V	k	ks		
<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	V	k	5		
<i>Linyphia tenuipalpis</i> Simon, 1884	V	2			
<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1830	V	k	5	1829	
<i>Linyphia alpicola</i> van Helsdingen, 1969	V	k	5		
<i>Lessertinella kulczynskii</i> (Lessert, 1907)	V	k	6	1909	
<i>Maro minutus</i> O. P.-Cambridge, 1906	V	k	5		
<i>Erigonella subelevata</i> (L. Koch, 1869)	V	k	6	E. s. subelevata	
<i>Gonatium hilare</i> (Thorell, 1875)	V	k	6		
<i>Gonatium ensipotens</i> (Simon, 1881)	V				
<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)	V	k	6		
<i>Glyphesis tauplesius</i> Wunderlich, 1969	V				
<i>Glyphesis servulus</i> (Simon, 1881)	V	k	6		
<i>Glyphesis cottonae</i> (La Touche, 1945)	V				
<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)	V	k	5		
<i>Formiphantes leptophantiformis</i> (Strand, 1907)	V	k	5	Leptophantes I.	
<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)	V	k	5		
<i>Evansia merens</i> O. P.-Cambridge, 1900	V	k	6		
<i>Erigone arctica maritima</i> Kulczynski, 1902	V			Platnick unterscheidet diese Unterart von der Stammform. Locket & Millidge (1953) betrachten E. a. maritima nur als Form. Hier wird für D nur eine Art gewertet.	
<i>Gonatium paradoxum</i> (L. Koch, 1869)	V	k	6		
<i>Erigonoplus globipes</i> (L. Koch, 1872)	V	k	6		
<i>Erigone longipalpis</i> (Sundevall, 1830)	V				
<i>Erigonella ignobilis</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	6		
<i>Erigonella hiemalis</i> (Blackwall, 1841)	V	k	6		
<i>Erigone tirolensis</i> L. Koch, 1872	V	k	6		
<i>Erigone remota</i> L. Koch, 1869	V	k	6		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Erigone promiscua (O. P.-Cambridge, 1872)	V				
Erigone jaegeri Baehr, 1984	V	k	N	E. jägeri	A: Thaler (1993b)
Erigone dentigera O. P.-Cambridge, 1874	V	k	6	E. capra	
Erigone cristatopalpus Simon, 1884	N	k	6	E. cristatipalpus	D: Muster & Leipold (1999)
Erigone autumnalis Emerton, 1882			k		
Erigone atra Blackwall, 1833	V	k	6		
Incestophantes kotulai (Kulczynski, 1904)			k	5 Lepthyphantes n., 1905	
Mecopisthes peusi Wunderlich, 1972	V			N	A: Malicky (1972b)
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943)				N Erigonopterna j.	A: Malicky (1972a)
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833)	V	k	6		
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)	V	k	6		
Improphanes improbulus (Simon, 1929)	V			Lepthyphantes i.	
Improphanes geniculatus (Kulczynski, 1898)	V		N	Lepthyphantes g.	A: Malicky (1972b)
Improphanes decolor (Westring, 1861)	V			Lepthyphantes d., 1862	
Improphanes complicatus (Emerton, 1882)			k	5 Lepthyphantes c.	
Hypocephalus paulae (Simon, 1918)				k	
Improphanes nitidus (Thorell, 1875)	V	k	5	Lepthyphantes n.	
Hypocephalus dahli (Lessert, 1909)	V			6	
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)	V	k	6		
Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902)	V	k			
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834)	V	k	6		
Hylaphantes nigritus (Simon, 1881)	V	k	N		A: Steinberger & Thaler (1994)
Hylaphantes graminicola (Sundevall, 1830)	V	k	N	1829, Erigonidium g.<i>	A: Steinberger & Thaler (1994)
Gongyliellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875)	V	k			
Gonatium rubens (Blackwall, 1833)	V	k	6		
Gongyliellum edentatum Miller, 1951	V		6		
Hypselistes jacksoni (O. P.-Cambridge, 1902)	V				
Gongyliellum murcidum Simon, 1884	V	k	6		
Incestophantes frigidus (Simon, 1884)			k	Lepthyphantes f.	
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)	V	k	6	Sundevall	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Halorates reprobus (O. P.-Cambridge, 1879)	V				
Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958)				N	A: Malicky (1972a)
Hilaira tatica Kulczynski, 1915	V	k	5	H. tatica tatica	
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	5	1870	
Hilaira herniosa (Thorell, 1875)				k	
Hilaira montigena (L. Koch, 1872)	V	k	5	1873	
Helophora insignis (Blackwall, 1841)	V	k	5		
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	6		
Tetragnathidae					
Tetragnatha shoshone Levi, 1981	V			ks	
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)	V	k	2		
Tetragnatha montana Simon, 1874	V	k	2		
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886	V	k		kh	
Tetragnatha obtusa C.L. Koch, 1837	V	k	2		
Tetragnatha reimoseri (Rosca, 1939)	V			N Eucta kaestneri	A: Nemenz (1967)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830	V	k	2		
Tetragnatha striata L. Koch, 1862	V	k		ks	
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870	V	k	2		
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830	V	k	2		
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823	V	k	2		
Metellina segmentata (Clerck, 1757)	V	k	2		
Metellina merianae (Scopoli, 1763)	V	k	2		
Metellina mengei (Blackwall, 1869)	V	k	2		
Meta menardi (Latreille, 1804)	V	k	2		
Meta bourneti Simon, 1922	V	k		Anmerkung: Die Gattungen Meta, Metella und Zygiella wurden auch als zu einer eigenen Familie "Metidae" gehörig betrachtet	
Tetragnatha dear mata Thorell, 1873	V	k	2		
Pachygnatha terilis Thaler, 1991			2	ks	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Araneidae					
Hypsosinga heri (Hahn, 1831)	V	k	ks		
Larinoides patagiatus (Clerck, 1757)	V	k	2		
Larinoides ixobolus (Thorell, 1873)	V		kh		
Larinoides folium (Schrank, 1803)	V		kh		
Larinoides cornutus (Clerck, 1757)	V	k	2		
Larinia elegans Spassky, 1939			N	Singa phragmiteti	A: Nemenz (1958)
Larinia bonneti Spassky, 1939			N		A: Jäger (1995a)
Larinoides sclopetarius (Clerck, 1757)	V	k	2		
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)	V	k	2	1832	
Singa hamata (Clerck, 1757)	V	k	2		
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)	V	k	2		
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)	V	k		1834	
Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844)	V	k	2		
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)	V	k	2		
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)	V	k	2		
Neoscona subfusca (C.L. Koch, 1837)			k		
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)	V	k	2		
Singa nitidula C.L. Koch, 1844	V	k	2		
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)	V	k	2		
Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)	V	k	ks	Anmerkung: Diese Gattung wurde in den letzten Jahrzehnten oft zu den Tetragnathidae oder Metidae gestellt	
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)	V	k	N		A: Thaler (1993a)
Zygiella montana (C.L. Koch, 1834)	V	k	2	1839	
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)	V	k	2		
Zygiella stroemi (Thorell, 1870)	V	k	2		
Zygiella thorelli (Ausserer, 1871)	V	k	N		A: Horak & Kropf (1999)
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870)	V	k	2		
Nuctenea silvicultrix (C.L. Koch, 1844)	V				

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1757	V	k	2		
<i>Araneus alsine</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	2		
<i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	2		
<i>Aculepeira armida</i> (Audouin, 1826)			k	1825	
<i>Aculepeira carbonaria</i> (L. Koch, 1869)			k	2	
<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	V	k	2		
<i>Araneus circe</i> (Audouin, 1826)	V	k	2	1825 (vgl. BZN 1987)	
<i>Araneus grossus</i> (C.L. Koch, 1844)	V		2		
<i>Araneus marmoreus</i> Clerck, 1757	V	k	2		
<i>Araneus nordmanni</i> (Thorell, 1870)	V	k	2		
<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1757	V	k	2	1758	
<i>Araneus saevus</i> (L. Koch, 1872)	V	k	2		
<i>Araneus sturmi</i> (Hahn, 1831)	V	k	2	Atea s.	
<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	V	k	2		
<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	2		
<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1757	V	k	2		
<i>Araneus triguttatus</i> (Fabricius, 1775)	V	k	2	Atea t.	
<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)	V	k	2		
<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)	V	k	2		
<i>Cyclosa oculata</i> (Walckenaer, 1802)	V		2		
<i>Araniella proxima</i> (Kulczynski, 1885)	V		2		
<i>Araniella opistographa</i> (Kulczynski, 1905)	V	k	2	A. opistographa	
<i>Araniella inconspicua</i> (Simon, 1874)	V	k	N		A: Sacher (1984)
<i>Araniella displicata</i> (Hentz, 1847)	V	k	2		
<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1757)	V	k	2		
<i>Araniella alpica</i> (L. Koch, 1869)	V	k	2		

Lycosidae

<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	V	k	3
<i>Alopecosa taeniata</i> (C.L. Koch, 1835)	V	k	3

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Alopecosa solitaria</i> (Herman, 1879)			L		
<i>Alopecosa striatipes</i> (C.L. Koch, 1837)	V	k		1839	
<i>Alopecosa sulzeri</i> (Pavesi, 1873)	V	k	L		
<i>Alopecosa schmidti</i> (Hahn, 1835)	V		L		
<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757)	V	k	3		
<i>Arctosa alpigena alpigena</i> (Doleschall, 1852)	V	k	3	<i>A. alpigena</i>	
<i>Arctosa alpigena lamperti</i> Dahl, 1908	V	k	3	mit Klammern, <i>A. lamperti</i> auct.	
<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)	V	k	3		
<i>Arctosa maculata</i> (Hahn, 1822)	V	k	3		
<i>Alopecosa pinetorum</i> (Thorell, 1856)	V	k	3		
<i>Acantholycosa lignaria</i> (Clerck, 1757)	V	k	3	1758; <i>Pardosa</i> l.	
<i>Arctosa figurata</i> (Simon, 1876)	V	k	3	ohne Klammern	
<i>Alopecosa mariae</i> (Dahl, 1908)	V		L		
<i>Alopecosa inquilina</i> (Clerck, 1757)	V	k	3		
<i>Alopecosa fabrilis</i> (Clerck, 1757)	V	k			
<i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831)	V		L	<i>A. cursor cursor</i>	
<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)	V	k	3		
<i>Alopecosa barbipes</i> (Sundevall, 1833)	V			1832	
<i>Alopecosa albofasciata</i> (Brullé, 1832)			k		
<i>Alopecosa aculeata</i> (Clerck, 1757)	V	k	3	1758	
<i>Alopecosa accentuata</i> (Latreille, 1817)	V	k	3		
<i>Acantholycosa rupicola</i> (Dufour, 1820)			k	<i>A. pyrenaea</i> auct. (vgl. Hänggi 1999)	
<i>Acantholycosa pedestris</i> (Simon, 1876)	V	k	3	<i>Pardosa</i> p.	
<i>Acantholycosa norvegica</i> (Thorell, 1872)			2		
<i>Arctosa lutetiana</i> (Simon, 1876)	V	k	3	<i>Tricca</i> l.	
<i>Acantholycosa norvegica sudetica</i> (L. Koch, 1875)	V		3	<i>Pardosa</i> n.s.	
<i>Pardosa riparia</i> (C.L. Koch, 1833)	V	k	3		
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	V	k			
<i>Pardosa vittata</i> (Keyserling, 1863)			k	L	
<i>Pardosa torrentum</i> Simon, 1876	V	k	3		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908)	V			3	
Pardosa sordidata (Thorell, 1875)	V	k	L		
Pirata hygrophilus Thorell, 1872	V	k	3		
Pardosa saturatior Simon, 1937	V	k	3		
Pirata insularis Emerton, 1885	V				
Pardosa pseudostrigillata Tongiorgi, 1966				3	
Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847)	V	k	L	P. p. tenuipes (vgl. Platnick 1993)	
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)	V	k	3	P. p. prativaga	
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)	V	k	3		
Pardosa paludicola (Clerck, 1757)	V	k	3		
Pardosa oreophila Simon, 1937	V	k	3		
Pardosa schenkeli Lessert, 1904				k	
Trochosa hispanica (Simon, 1870)				k	
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)	V	k	3	1832	
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)	V	k	3		
Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)	V	k	3		
Trochosa terricola Thorell, 1856	V	k	3		
Trochosa spinipalpis (F.O. P.-Cambridge, 1895)	V	k	3		
Pardosa wagleri (Hahn, 1822)	V	k	3		
Trochosa robusta (Simon, 1876)	V	k	3		
Pardosa pullata (Clerck, 1757)	V	k	3		
Pirata uliginosus (Thorell, 1856)	V	k	3		
Pirata tenuitarsis Simon, 1876	V	k	3		
Pirata piscatorius (Clerck, 1757)	V	k	3		
Pirata piraticus (Clerck, 1757)	V	k	3		
Pirata latitans (Blackwall, 1841)	V	k	3		
Pirata knorri (Scopoli, 1763)	V	k	3		
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)	V	k	3		
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)	V	k	L		
Pardosa baehrorum Kronestedt, 1999	N	2	L		D: Kronestedt (1999)

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Pardosa amentata (Clerck, 1757)	V	k	3		
Pardosa albatula (Roewer, 1951)				L	
Pardosa alacris (C.L. Koch, 1833)	V	2	3		
Pardosa agricola (Thorell, 1856)	V				
Pardosa nigra (C.L. Koch, 1834)	V	k	3		
Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834)	V	k	3		
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000	N	2	N	Anmerkung: der Name P. saltans wurde schon vor der Erstbeschreibung im richtigen Sinne aber als "nomen nudum" verwendet	D, CH & A: Töpfer-Hofmann et al. (2000)
Pardosa agrestis purbeckensis F.O. P.-Cambridge, 1895	V			P. purbeckensis	
Hogna radiata (Latreille, 1817)		k	L	Lycosa r.	
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)	V	k	3		
Arctosa stigmosa (Thorell, 1875)	V	k	3	ohne Klammern	
Arctosa renidescens Buchar & Thaler, 1995		k	3	A. renidens auct.	
Arctosa personata (L. Koch, 1872)		k			
Arctosa perita (Latreille, 1799)	V	k			
Pardosa agrestis (Westring, 1861)	V	k	3	1862	
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872)				L	
Pardosa blanda (C.L. Koch, 1834)	V	k	3	1833	
Pardosa monticola (Clerck, 1757)	V	k	3		
Pardosa mixta (Kulczynski, 1887)	V	k	3		
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982				L	
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)	V	k	3		
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)				L	
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872)	V				
Pardosa morosa (L. Koch, 1870)	V	k	L		
Pardosa hortensis (Thorell, 1872)	V	k	3		
Pardosa giebeli (Pavesi, 1873)	V	k	3		
Pardosa fulvipes (Collett, 1875)	V		3		
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870)	V	k	3		
Pardosa cibrata Simon, 1876				L	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Pardosa cincta Kulczynski, 1887				3	
Pisauridae					
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)	V	k	3		
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757)	V	k	3		
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)	V	k	ks		
Oxyopidae					
Oxyopes heterophthalmus Latreille, 1804	V				
Oxyopes lineatus Latreille, 1806		k		1866 (lapsus)	
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778)	V	k	3	(Panzer, 1804)	
Zoropsidae					
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)			N		A: Thaler & Knoflach (1998)
Agelenidae					
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872	V	k	3		
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)	V	k	3		
Textrix denticulata (Olivier, 1789)	V	k	3		
Tegenaria tridentina L. Koch, 1872	N	k	3		D: Muster (1999)
Tegenaria picta Simon, 1870	V	k			
Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)			k		
Tegenaria pagana C.L. Koch, 1841			k		
Tegenaria mirifica Thaler, 1987			k	3	
Tegenaria fuesslini Pavesi, 1873			k		
Tegenaria campestris C.L. Koch, 1834	V		kh		
Tegenaria atrica C.L. Koch, 1843	V	k	3		
Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802)	V	k	3		
Histopona torpida (C.L. Koch, 1834)	V	k	3		
Histopona luxurians (Kulczynski, 1897)				kh	
Agelena gracilens C.L. Koch, 1841	V	k	3		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Histopona italica</i> Brignoli, 1977			k		
<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)	V	k	3		
<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)	V	k	3		
<i>Textrix caudata</i> L. Koch, 1872	N	k			D: Broen (1995)
Cybaeidae					
<i>Cybaeus angustiarum</i> L. Koch, 1868	V		N	Anmerkung: Diese Gattung wird zum Teil auch zu den Agelenidae (s.lat.) gestellt	A: Freudenthaler (1994)
<i>Cybaeus tetricus</i> (C.L. Koch, 1839)	V	k	3		
<i>Cybaeus montanus</i> Maurer, 1992			1		
<i>Cybaeus intermedius</i> Maurer, 1992			1		
<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757)	V	k	3	vormals in eigener Familie: Argyronetidae	
<i>Cybaeus minor</i> Chyzer, 1897			ks		
Hahniidae					
<i>Hahnia microphtalma</i> Snazell & Duffey, 1980	N				D: Sührig et al. (1998)
<i>Cryphoeca silvicola</i> (C.L. Koch, 1834)	V	k	3		
<i>Tuberta maerens</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	V			Anmerkung: Diese Gattung wird zum Teil auch zu den Agelenidae (s.lat.) gestellt	
<i>Hahnia pusilla</i> C.L. Koch, 1841	V	k	3		
<i>Hahnia petrobia</i> Simon, 1875	V				
<i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875	V	k	3		
<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)	V	k	3		
<i>Hahnia montana</i> (Blackwall, 1841)	V	k	3		
<i>Hahnia candida</i> Simon, 1875	V	2			
<i>Cryphoeca nivalis</i> Schenkel, 1919			k 3		
<i>Cryphoeca lichenum nigerrima</i> Thaler, 1978	N		3		D: Muster & Leipold (1999)
<i>Cryphoeca lichenum lichenum</i> L. Koch, 1876			3		
<i>Cryphoeca brignolii</i> Thaler, 1980		k		Anmerkung: Diese Gattung wird zum Teil auch zu den Agelenidae (s.lat.) gestellt	
<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	V	k	3		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Hahnia helveola Simon, 1875	V	k	3		
Hahnia difficilis Harm, 1966	V	k	3		
Dictynidae					
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830)	V	k	2	1825	
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951)	V	k	2		
Emblyna brevidens (Kulczynski, 1897)	V	k		Dictyna b.	
Lathys humilis (Blackwall, 1855)	V	k	2		
Lathys nielseni (Schenkel, 1932)	V	k	2		
Lathys stigmatisata (Menge, 1869)	V	k	ks	L. puta auct.	
Marilynia bicolor (Simon, 1870)	V		N	Dictyna b.	A: Nemenz (1959)
Mastigusa macrophthalma (Kulczynski, 1897)			ks	Nach Wunderlich (1986) kommt M. macrophthalma gesichert nur in Ungarn und Nord-Ex-Jugoslawien vor. Die Nachweise aus Nord-, West- und Mitteleuropa beträfen demnach M. arietina	
Nigma puella (Simon, 1870)	V	k			
Dictyna uncinata Thorell, 1856	V	k	2		
Dictyna pusilla Thorell, 1856	V	k	2		
Mastigusa arietina (Thorell, 1871)	V	k	3	Anmerkung: Diese Gattung wird zum Teil auch zu den Agelenidae (s.lat.) gestellt	
Altella lucida (Simon, 1874)	V				
Emblyna mitis (Thorell, 1875)	V				
Dictyna major Menge, 1869	V				
Altella biuncata (Miller, 1949)	V	2	2		
Archaeodictyna ammophila (Menge, 1871)	V				
Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872)	V		2	Dictyna c.	
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958)			N	Dictyna m.	A: Malicky (1972a)
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861)	V	k	2		
Brommella falcigera (Balogh, 1935)	V		2		
Cicurina cicur (Fabricius, 1793)	V	k	3	Anmerkung: Diese Gattung wird zum Teil auch zu den Agelenidae (s.lat.) gestellt	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus, 1758)	V	k	2		
<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1850)	V	k	kh		
<i>Dictyna latens</i> (Fabricius, 1775)	V	k	N		A: Jäger (1995a)
<i>Argenna patula</i> (Simon, 1874)	V		N	1875	A: Zulka et al. (1997)
Amaurobiidae					
<i>Coelotes rudolfi</i> (Schenkel, 1925)			k		
<i>Coelotes atropos</i> (Walckenaer, 1830)	V	k			
<i>Coelotes longispinus</i> Kulczynski, 1897			kh		
<i>Coelotes mediocris</i> Kulczynski, 1887			k		
<i>Coelotes pabulator</i> Simon, 1875			k		
<i>Coelotes pastor</i> pickardi O. P.-Cambridge, 1873			k	Anmerkung: die Typus-Unterart <i>C. pastor pastor</i> kommt in der Schweiz nicht vor	
<i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834)	V	k	3		
<i>Coelotes poleneci</i> Wiegle, 1964			ks		
<i>Coelotes solitarius</i> L. Koch, 1868	V		3		
<i>Coelotes anoplus</i> Kulczynski, 1897			ks		
<i>Coelotes pastor tirolensis</i> Simon, 1875			k		
<i>Callobius claustrarius</i> (Hahn, 1833)	V	k	2	1831	
<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	V	k			
<i>Amaurobius pallidus</i> L. Koch, 1868	V				
<i>Amaurobius obustus</i> L. Koch, 1868	V		kh		
<i>Amaurobius jugorum</i> L. Koch, 1868	V	k	2		
<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)	V	k	2	1825	
<i>Amaurobius fenestralis</i> (Stroem, 1768)	V	k	2		
<i>Amaurobius erberi</i> (Keyserling, 1863)			k	N	A: Thaler & Steiner (1993)
<i>Amaurobius crassipalpis</i> Canestrini & Pavesi, 1870	V	k			
<i>Coelotes alpinus</i> Polenec, 1972			ks	Anmerkung: Diese Gattung wird zum Teil auch zu den Agelenidae (s.lat.) gestellt	
<i>Coelotes inermis</i> (L. Koch, 1855)	V	k	3		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Titanoecidae					
<i>Titanoeca nivalis</i> Simon, 1874		k	2		
<i>Titanoeca tristis</i> L. Koch, 1872		k			
<i>Titanoeca schineri</i> L. Koch, 1872			N		A: Nemenz (1959)
<i>Titanoeca psammophila</i> Wunderlich, 1993	V				
<i>Nurscia albomaculata</i> (Lucas, 1846)	V				
<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn, 1833)	V	k	2	1831	
Anyphaenidae					
<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	4		
Liocranidae					
<i>Liocranum rutilans</i> (Thorell, 1875)	V	k	ks		
<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839	V	k	4		
<i>Scotina palliardi</i> (L. Koch, 1881)	V	k	4		
<i>Scotina gracilipes</i> (Blackwall, 1859)	V	k			
<i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)	V	k			
<i>Phrurolithus szilyi</i> Herman, 1879			g		
<i>Phrurolithus nigrinus</i> (Simon, 1878)			k		
<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	V	k	4		
<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	V	k	4		
<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)	V	k	4		
<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873	V	k	4		
<i>Agroeca dentigera</i> Kulczynski, 1913	V				
<i>Agroeca inopina</i> O. P.-Cambridge, 1886			2		
<i>Phrurolithus pullatus</i> Kulczynski, 1897	V		g		
<i>Agroeca lusatica</i> (L. Koch, 1875)	V				
<i>Agraecina striata</i> (Kulczynski, 1882)	V	k	4		
<i>Agroeca proxima</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	4	1870	
<i>Apostenus fuscus</i> Westring, 1851	V	k	4		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Clubionidae					
<i>Clubiona subtilis</i> L. Koch, 1867	V	k			
<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843	V	k	4		
<i>Clubiona kulczynskii</i> Lessert, 1905	V	k	4	1910	
<i>Clubiona leucaspis</i> Simon, 1932	V				
<i>Clubiona lutescens</i> Westring, 1851	V	k	4		
<i>Clubiona marmorata</i> L. Koch, 1866	V		4		
<i>Clubiona neglecta</i> O. P.-Cambridge, 1862	V	k	4		
<i>Clubiona norvegica</i> Strand, 1900	V		4		
<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1757)	V	k	4		
<i>Clubiona juvenis</i> Simon, 1878	V	k	N		A: Nemenz (1967)
<i>Clubiona pseudonelecta</i> Wunderlich, 1994	V	2			
<i>Clubiona reclusa</i> O. P.-Cambridge, 1863	V	k	4		
<i>Clubiona saxatilis</i> L. Koch, 1866			4		
<i>Clubiona similis</i> L. Koch, 1867	V	k	4	Anmerkung: wohl nur Nachweise aus dem Alpen- und Voralpenraum, übrige wohl <i>C. frisia</i>	
<i>Clubiona hilaris</i> Simon, 1878		k	4		
<i>Clubiona subsultans</i> Thorell, 1875	V	k	4		
<i>Clubiona diversa</i> O. P.-Cambridge, 1862	V	k	4		
<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851	V	k	4	1862	
<i>Clubiona trivialis</i> C.L. Koch, 1843	V	k	4	1841	
<i>Clubiona vegeta</i> Simon, 1918		k			
<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski, 1897	V	k	4		
<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833)	V	k	4		
<i>Cheiracanthium campestre</i> Lohmander, 1944	V		ks		
<i>Cheiracanthium effosum</i> Herman, 1879	V		N		A: Nemenz (1959)
<i>Cheiracanthium elegans</i> Thorell, 1875	V		kh		
<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	kh		
<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	V	k	N		A: Jäger (1995a)
<i>Cheiracanthium montanum</i> L. Koch, 1878	V	k			

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871	V	k	4	C. ongognathum (lapsus)	
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873	V		N		A: Nemenz (1958)
Clubiona frutetorum L. Koch, 1866	V	k	4	1867	
Cheiracanthium rupestre Herman, 1879				kh	
Clubiona germanica Thorell, 1870	V	k	4	1872	
Clubiona alpicola Kulczynski, 1881	V	k	4	1882 (vgl. Blick 1998)	
Clubiona brevipes Blackwall, 1841	V	k	N	mit Klammern	A: Horak & Kropf (1999)
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867	V	k	4	C. coeruleascens	
Clubiona comta C.L. Koch, 1839	V	k	4	C. compta	
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)	V	k	4		
Clubiona frisia Wunderlich & Schuett, 1995	V				
Clubiona genevensis L. Koch, 1866	V	k	4	1867	
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)	V	k	kh		
Corinnidae					
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868)	V	k	g	voher bei Liocranidae; Ceto I.	
Zodariidae					
Zodarion germanicum (C.L. Koch, 1837)	V		kh		
Zodarion rubidum Simon, 1914	V	k	2		
Zodarion hamatum Wiegle, 1964			N		A: Horak & Kropf (1999)
Zodarion italicum (Canestrini, 1868)	V	k		Z. gallicum auct. (vgl. Hänggi 1999)	
Gnaphosidae					
Poecilochroa conspicua (L. Koch, 1866)	V	k	3		
Zelotes aeneus (Simon, 1878)	V	k	3		
Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872)	V	k	g	Zelotes r.	
Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)	V	k	3	Zelotes p.	
Trachyzelotes kulczynskii (Bösenberg, 1902)	V				
Synaphosus sauvage Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994			2		
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866)	V		3		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Scotophaeus scutulatus</i> (L. Koch, 1866)	V	k	3		
<i>Scotophaeus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	V	k	3		
<i>Gnaphosa tigrina</i> Simon, 1878			k		
<i>Scotophaeus nanus</i> Wunderlich, 1995			N		A: Wunderlich (1995b)
<i>Zelotes zellensis</i> Grimm, 1982			g		
<i>Poecilochroa variana</i> (C.L. Koch, 1839)	V	k			
<i>Zelotes aurantiacus</i> Miller, 1967	V				
<i>Phaeocedus braccatus</i> (L. Koch, 1866)	V	k	g		
<i>Parasyrisca vinosa</i> (Simon, 1878)		k		Drassodes vinosus	
<i>Nomisia exornata</i> (C.L. Koch, 1839)		k			
<i>Micaria subopaca</i> Westring, 1861	V	k	3	1862	
<i>Micaria simplex</i> Bösenberg, 1902	V				
<i>Micaria silesiaca</i> L. Koch, 1875	V	k	3		
<i>Micaria rossica</i> Thorell, 1875		k	3		
<i>Micaria romana</i> L. Koch, 1866		k	N		A: Zulka et al. (1997)
<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1832)	V	k	3	1831	
<i>Micaria nivosa</i> L. Koch, 1866	V	k	3		
<i>Scotophaeus blackwalli</i> (Thorell, 1871)	V	k	g		
<i>Zelotes hermani</i> (Chyzer, 1897)		2	ks		
<i>Zelotes tenuis</i> (L. Koch, 1866)		2			
<i>Zelotes talpinus</i> (L. Koch, 1872)		k	3		
<i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833)	V	k	3		
<i>Zelotes similis</i> (Kulczynski, 1887)	V	k	3		
<i>Zelotes pygmaeus</i> Miller, 1943			N		A: Malicky (1972a)
<i>Zelotes puritanus</i> Chamberlin, 1922	V	k	3		
<i>Zelotes pseudoclivicola</i> Grimm, 1982	V	1			
<i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1839)	V	k	3		
<i>Zelotes oblongus</i> (C.L. Koch, 1833)	V	k	g	1839	
<i>Zelotes mundus</i> (Kulczynski, 1897)			N		A: Zulka et al. (1997), Bauchhenß et al. (1997)

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Zelotes apricorum</i> (L. Koch, 1876)	V	k	3		
<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	V	k	3		
<i>Zelotes atrocaeruleus</i> (Simon, 1878)	V	1	g		
<i>Zelotes gracilis</i> (Canestrini, 1868)			g		
<i>Zelotes gallicus</i> Simon, 1914			k		
<i>Zelotes exiguum</i> (Müller & Schenkel, 1895)	V	k	3		
<i>Zelotes erebeus</i> (Thorell, 1870)	V	k	3		
<i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839)	V	k	kh		
<i>Zelotes devotus</i> Grimm, 1982		2	3		
<i>Zelotes declinans</i> (Kulczynski, 1897)			g		
<i>Zelotes clivicola</i> (L. Koch, 1870)	V	k	3		
<i>Zelotes civicus</i> (Simon, 1878)			k		
<i>Zelotes caucasicus</i> (L. Koch, 1866)			g		
<i>Micaria lenzi</i> Bösenberg, 1899	V				
<i>Zelotes longipes</i> (L. Koch, 1866)	V	k	g		
<i>Haplodrassus cognatus</i> (Westring, 1861)	V	k	3	1862	
<i>Gnaphosa lapponum</i> (L. Koch, 1866)			k		
<i>Gnaphosa inconspecta</i> Simon, 1878	V		3		
<i>Gnaphosa bicolor</i> (Hahn, 1833)	V	k	3		
<i>Gnaphosa badia</i> (L. Koch, 1866)	V	k	3		
<i>Gnaphosa alpica</i> Simon, 1878			k		
<i>Echemus angustifrons</i> (Westring, 1861)	V	k	3	1862	
<i>Drassyllus villicus</i> (Thorell, 1875)	V	k	kh	<i>Zelotes v.</i>	
<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)	V	k	3	<i>Zelotes p.</i>	
<i>Drassyllus pumilus</i> (C.L. Koch, 1839)	V	k	3	<i>Zelotes p.</i>	
<i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch, 1866)	V	k	kh	<i>Zelotes p.</i>	
<i>Gnaphosa leporina</i> (L. Koch, 1866)	V	k	3		
<i>Drassodes villosus</i> (Thorell, 1856)	V	k	3		
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	V	k	g	<i>Zelotes l.</i>	
<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	3		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Drassodes hypocrita</i> (Simon, 1878)	V				
<i>Drassodes hispanus</i> var. <i>lesserti</i> Schenkel, 1936	V	k			
<i>Drassodes heeri</i> (Pavesi, 1873)	V	k	3		
<i>Drassodes cupreus</i> (Blackwall, 1834)	V	k	3		
<i>Cryptodrassus hungaricus</i> Balogh, 1935		2		C. pulchellus	
<i>Callilepis schuszteri</i> (Herman, 1879)	V	k	3		
<i>Callilepis nocturna</i> (Linnaeus, 1758)	V	k	3		
<i>Berlandina nubivaga</i> (Simon, 1878)			k		
<i>Berlandina cinerea</i> (Menge, 1872)	V	k	g		
<i>Micaria guttulata</i> (C.L. Koch, 1839)	V	k			
<i>Haplodrassus minor</i> (O. P.-Cambridge, 1879)	V	k	ks		
<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)	V	k	3		
<i>Gnaphosa lucifuga</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	3		
<i>Micaria formicaria</i> (Sundevall, 1832)	V	k	3	1831	
<i>Micaria dives</i> (Lucas, 1846)	V		3		
<i>Micaria alpina</i> L. Koch, 1872			k	3	
<i>Micaria albimana</i> O. P.-Cambridge, 1872	V	k		mit Klammern (vgl. Platnick 1993)	
<i>Micaria aenea</i> Thorell, 1871	N	k	3		D: Muster & Leipold (1999)
<i>Haplodrassus umbratilis</i> (L. Koch, 1866)	V	k	3		
<i>Haplodrassus sylvestris</i> (Blackwall, 1833)	V	k	3	H. silvestris	
<i>Haplodrassus soerensenii</i> (Strand, 1900)	V	k	3		
<i>Haplodrassus moderatus</i> (Kulczynski, 1897)	V	k			
<i>Micaria fulgens</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	3		
<i>Gnaphosa nigerrima</i> L. Koch, 1877	V	k	3	1878	
<i>Gnaphosa lugubris</i> (C.L. Koch, 1839)	V	k	kh		
<i>Gnaphosa microps</i> Holm, 1939	V				
<i>Gnaphosa modestior</i> Kulczynski, 1897			g		
<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)	V	k	3		
<i>Gnaphosa muscorum</i> (L. Koch, 1866)	V	k	3		
<i>Haplodrassus kulczynskii</i> Lohmander, 1942	V	k	kh		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Gnaphosa opaca Herman, 1879	V			g	
Gnaphosa petrobia L. Koch, 1872	V	k		3	
Gnaphosa rhenana Müller & Schenkel, 1895	V	k		3	
Haplodrassus aenus Thaler, 1984			k	3	
Haplodrassus dalmatinus (L. Koch, 1866)	V	k		g	
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866)	V	k		3	
Zoridae					
Zora parallela Simon, 1878	V		2		
Zora spinimana (Sundevall, 1833)	V	k		4	
Zora silvestris Kulczynski, 1897	V	k		4	
Zora manicata Simon, 1878	V	k			
Zora armillata Simon, 1878	V			N	A: Zulka et al. (1997)
Zora alpina Kulczynski, 1915			k		Z. nigrimana (vgl. Platnick 1993)
Zora nemoralis (Blackwall, 1861)	V	k		4	
Sparassidae					
Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767)	N			Anmerkung: Jahreszahl gemäß Bonnet (1951), contra Platnick (1998)	D: Tolke & Hiebsch (1995)
Micrommata virescens (Clerck, 1757)	V	k	4	vormals Familienname Heteropodidae (vgl. Jäger 1999)	
Philodromidae					
Thanatus striatus C.L. Koch, 1845	V	k		4	
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871	V	k			
Philodromus pulchellus Lucas, 1846				N	A: Jäger (1995a)
Philodromus rufus Walckenaer, 1826	V	k		kh	
Philodromus vagulus Simon, 1875	V	k		4	
Thanatus arenarius L. Koch 1872	V			N	Thorell, 1872 (vgl. Logunov 1996)
Thanatus atratus Simon, 1875	V	2		N	A: Malicky (1972a)
Thanatus coloradensis Keyserling, 1880			k	4	T. vulgaris auct.
					A: Jäger (1995a)
					T. alpinus

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757)	V	k	4		
<i>Philodromus poecilus</i> (Thorell, 1872)	V	k	kh		
<i>Thanatus sabulosus</i> (Menge, 1875)	V	k	4	1874	
<i>Tibellus macellus</i> Simon, 1875			k		
<i>Paratibellus oblongiusculus</i> (Lucas, 1846)			k		
<i>Tibellus maritimus</i> (Menge, 1875)	V	k	N		A: Nemenz (1958)
<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	4		
<i>Thanatus pictus</i> L. Koch, 1881	V		N		A: Malicky (1972a)
<i>Philodromus buddenbrocki</i> Braun, 1965			N		A: Jäger (1995a)
<i>Philodromus margaritatus</i> (Clerck, 1757)	V	k	4		
<i>Philodromus albidus</i> Kulczynski, 1911	V	k	4		
<i>Philodromus buxi</i> Simon, 1884	V	k		P. b. buxi	
<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	4	P. c. cespitum, P. c. similis (vgl. Platnick 1998)	
<i>Philodromus cespitum rufolimbatus</i> Kulczynski, 1891			k		
<i>Philodromus collinus</i> C.L. Koch, 1835	V	k	4	P. c. collinus	
<i>Philodromus corticinus</i> (C.L. Koch, 1837)	V	k	4		
<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	V	k	4		
<i>Philodromus emarginatus</i> (Schrank, 1803)	V	k	4		
<i>Philodromus fallax</i> Sundevall, 1833	V				
<i>Philodromus fuscomarginatus</i> (De Geer, 1778)	V	k	4		
<i>Philodromus histrio</i> (Latreille, 1819)	V	k	N		A: Nemenz (1958)
<i>Philodromus longipalpis</i> Simon, 1870	N	k		P. cespitum pallens (vgl. Platnick 1998)	D: Jäger & Kreuels (1995)
<i>Philodromus depriesteri</i> Braun, 1965	V				
<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1757)	V	k	4	P. a. aureolus, P. a. variegatus (vgl. Platnick 1998)	

Thomisidae

<i>Xysticus albomaculatus</i> Kulczynski, 1891	V
<i>Xysticus gallicus</i> Simon, 1875	V k 4
<i>Xysticus ferrugineus</i> Menge, 1876	V
<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)	V k 4

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Xysticus embriki Kolosvary, 1935				N	
Xysticus desidiosus Simon, 1875	V	k	4		A: Malicky (1972a)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)	V	k	4		
Xysticus cor (Canestrini, 1873)			k	4	
Xysticus bonneti Denis, 1938				4	
Xysticus audax (Schrank, 1803)	V	k	4		
Xysticus kempeleni Thorell, 1872	V	k			
Xysticus secedens L. Koch, 1876				4	
Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837	V	k	4		
Xysticus kochi Thorell, 1872	V	k	4		
Xysticus lineatus (Westring, 1851)	V	k	N		A: Breuss (1996)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)	V	k	4		
Xysticus macedonicus Silhavy, 1944				4	
Xysticus ninnii Thorell, 1872	V	k	4	X. n. ninnii	
Xysticus obscurus Collett, 1877				4	
Xysticus paniscus L. Koch, 1875	V				
Xysticus acerbus Thorell, 1872	V	k	4		
Xysticus sabulosus (Hahn, 1832)	V	k	kh		
Xysticus lanio C.L. Koch, 1835	V	k	4	1824	
Xysticus striatipes L. Koch, 1870	V	k			
Xysticus ulmi (Hahn, 1832)	V	k	4		
Xysticus viduus Kulczynski, 1898	V		4		
Xysticus robustus (Hahn, 1832)	V	k	4		
Heriaeus mellotteei Simon, 1886	V	k	N	H. mellotteei	A: Jäger (1995a)
Xysticus luctator L. Koch, 1870	V	k	4	X. cambridgei auct.	
Tmarus stellio Simon, 1875		2	N		A: Jäger (1995a)
Coriarachne depressa (C.L. Koch, 1837)	V	k	4		
Diae dorsata (Fabricius, 1777)	V	k	4		
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852)	V	k	N	1882	A: Jäger (1995a)
Misumena vatia (Clerck, 1757)	V	k	4		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775)	V	k	4		
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)	V	k	4	1810; Ozyptila (gilt für die ganze Gattung)	
Ozyptila blackwalli Simon, 1875	V	k	kh		
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)	V	k	kh	1831	
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)	V	k	4	O. nigrata	
Ozyptila gertschi Kurata, 1944	V				
Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)	V	k	4		
Pistius truncatus (Pallas, 1772)	V	k	4		
Tmarus piger (Walckenaer, 1802)	V	k	4		
Thomisus onustus Walckenaer, 1806	V	k	N		A: Hebar (1980)
Diaealivens Simon, 1876	V	k	4	D. pictilis	
Synema globosum (Fabricius, 1775)	V	k	4	Synaema g.	
Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)	V				
Ozyptila westringi (Thorell, 1873)	V				
Ozyptila trux (Blackwall, 1846)	V	k	4		
Ozyptila secreta Thaler, 1987			k		
Ozyptila pullata (Thorell, 1875)	V	2	N	O. kotulai	A: Malicky (1972a)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851)	V	k	4		
Ozyptila sanctuaria (O. P.-Cambridge, 1871)	V	1			
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862)	V	k	4		
Ozyptila rauda Simon, 1875	V	k	4		

Salticidae

Salticus unciger (Simon, 1868)		k		
Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867)		k		Euophrvs v.
Sitticus distinguendus (Simon, 1868)	V	k	4	S. histrio (vgl. Platnick 1989); S. helveolus
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802)	V	k	kh	1803
Saitis barbipes (Simon, 1868)	V	k		ohne Klammern
Salticus zebraneus (C.L. Koch, 1837)	V	k	4	
Salticus scenicus (Clerck, 1757)	V	k	4	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868)				ks	
Philaeus chrysops (Poda, 1761)	V	k	4		
Sitticus caricis (Westring, 1861)	V	k	4		
Salicus cingulatus (Panzer, 1797)	V	k	4		
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)	V	k	4	Euophrys l.	
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)	V	k	4	1825, Euophrys e.	
Pseudeuophrys brownningi (Millidge & Locket, 1955)	N			Anmerkung: Pseudeuophrys ist revalidiert	D: Platen et al. (1999)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)	V	k	4	P. delesserti	
Pellenes brevis (Simon, 1868)	V			P. arcigerus auct.	
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)	V	k	4		
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875)	V	k		(L. Koch, 1875)	
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870)	V				
Talavera inopinata Wunderlich, 1993	V	1			
Pellenes lapponicus (Sundevall, 1833)			k	4	
Phlegra fuscipes Kulczynski, 1891				N	A: Malicky (1972a)
Synageles hilarulus (C.L. Koch, 1846)	V	k	4		
Euophrys herbigrada (Simon, 1871)	V	k		ks	
Neon valentulus Falconer, 1912	V	k		N	A: Steinberger & Meyer (1995)
Yllenus arenarius Menge, 1868	V			Simon	
Talavera westringi (Simon, 1868)	V	k		T. poecilopus	
Talavera thorelli (Kulczynski, 1891)	V		4	Euophrys t.	
Talavera petrensis (C.L. Koch, 1837)	V	k	4	Euophrys p.	
Talavera monticola (Kulczynski, 1884)	N	k	4	Euophrys m. (vgl. Platnick 1998)	D: Muster & Leipold (1999)
Talavera milleri (Brignoli, 1983)	V				
Talavera aperta (Miller, 1971)	V	1			
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871)	V	k	4	Euophrys a.	
Synageles lepidus Kulczynski, 1897			k	4	
Sitticus floricola (C.L. Koch, 1837)	V	k	4		
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877)	V	k	4		
Sitticus terebratus (Clerck, 1757)	V	k	4		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Sitticus saxicola</i> (C.L. Koch, 1846)	V	k	4	1848	
<i>Sitticus saltator</i> (O. P.-Cambridge, 1868)	V		N		A: Malicky (1972b)
<i>Sitticus rupicola</i> (C.L. Koch, 1837)	V	k	4	Anmerkung: Nachweise unterhalb der montanen Stufe betreffen wohl <i>S. inexpectus</i>	
<i>Sitticus pubescens</i> (Fabricius, 1775)	V	k	4		
<i>Sitticus penicillatus</i> (Simon, 1875)	V	k	4		
<i>Sitticus longipes</i> (Canestrini, 1873)			k	4	
<i>Sitticus inexpectus</i> Logunov & Kronestedt, 1997	N		N		D, A: Logunov & Kronestedt (1997)
<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)	V	k	4		
<i>Chalcoscirtus nigritus</i> (Thorell, 1875)	V				
<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	4		
<i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835	V	k	kh		
<i>Neon reticulatus</i> (Blackwall, 1853)	V	k	4		
<i>Hasarius adansoni</i> (Audouin, 1826)	V				
<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)	V	k	4		
<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1757)	V	k	4		
<i>Euophrys terrestris</i> (Simon, 1876)			k		
<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	4		
<i>Heliophanus dampfi</i> Schenkel, 1923	V	k			
<i>Dendryphantes hastatus</i> (Clerck, 1757)	V	k	ks	1758	
<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1831)	V	k	4		
<i>Chalcoscirtus infimus</i> (Simon, 1868)	V	k	kh		
<i>Chalcoscirtus brevicymbialis</i> Wunderlich, 1980	N			C. pseudoinfimus auct.	D: Malt et al. (1998)
<i>Chalcoscirtus alpicola</i> (L. Koch, 1876)			4		
<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)	V	k	kh		
<i>Bianor aurocinctus</i> (Ohlert, 1865)	V	k	4		
<i>Ballus rufipes</i> (Simon, 1868)	V				
<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	V	k	4		
<i>Asianellus festivus</i> (C.L. Koch, 1834)	V	k	kh	Phlegra festiva	
<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1757)	V	k	4	Phlegra insignita	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1832)	V	k	4	1833	
Marpissa muscosa (Clerck, 1757)	V	k	4		
Neon rayi (Simon, 1875)	V				
Neon levis (Simon, 1871)	V	k	4		
Neaetha membrosa (Simon, 1868)	V			N. membranosa	
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)	V	k	4		
Menemerus falsificus Simon, 1868			k		
Marpissa radiata (Grube, 1859)	V	k	ks		
Evarcha laetaabunda (C.L. Koch, 1846)	V	k	kh	1848	
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846)	V	k			
Heliophanus dubius C.L. Koch, 1835	V	k	4	1848	
Marpissa canestrinii Ninni, 1868			k	N 1869, mit Klammern, Mithion c.	A: Nemenz (1967)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)	V		4	Eris n.	
Heliophanus lineiventris Simon, 1868	N	k	4		D: Muster & Leipold (1999), Sacher & Metzner (1999), Sacher & Breinl (1999)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)	V	k	4	ohne Klammern	
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)	V	k			
Heliophanus kochii Simon, 1868	V	k	N	H. kochi	A: Jäger (1995a)
Leptorchestes mutilloides (Lucas, 1846)			k		
Heliophanus melinus L. Koch, 1867			k		
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875	V	k	4		
Heliophanus simplex Simon, 1868				N	A: Nemenz (1959)
Heliophanus tribulosus Simon, 1868	V	k			
Icius subinermis Simon, 1937	V	k			
Leptorchestes berolinensis (C.L. Koch, 1846)	V	k	4		

Opiliones

Sironidae

Siro duricorius (Joseph, 1808)

m

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Travuniidae					
Peltonychia leprieuri (Lucas, 1860)			m		
Cladonychiidae					
Holoscotolemon unicolor Roewer, 1915	V		m		
Nemastomatidae					
Nemastoma bimaculatum (Fabricius, 1775)	V				
Paranemastoma bicuspisatum (C.L. Koch, 1835)	V	m	m		
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833)	V	m	m		
Nemastoma triste (C.L. Koch, 1835)	V		m		
Nemastoma schuelleri Gruber & Martens, 1968			m		
Nemastoma lugubre (Müller, 1776)	V	m	m		
Nemastoma dentigerum Canestrini, 1873	V	m			
Nemastoma bidentatum relictum Gruber & Martens, 1968			m		
Nemastoma bidentatum bidentatum Roewer, 1914			m		
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)	V	m	m		
Mitostoma alpinum (Hadzi, 1931)			m		
Carinostoma carinatum (Roewer, 1914)			m		
Nemastoma bidentatum sparsum Gruber & Martens, 1968			m		
Histicostoma dentipalpe (Ausserer, 1867)	V	m	m		
Dicranolasmatidae					
Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799)			m		
Trogulidae					
Anelasmococephalus cambridgei (Westwood, 1874)	V	m	m		
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)	V	m	m	1758 (lapsus)	
Trogulus tingiformis (C.L. Koch, 1848)	V		m		
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)	V	m	m	"Sammelart": vgl. auch T. closanicus & T. martensi	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Trogulus martensi Chemini, 1983	N	N			CH: Weiß et al. (1998); D: Malten (1999 Internet)
Trogulus falcipenis Komposch, 2000			k		s.a. Komposch (2000)
Trogulus closanicus Avram, 1971	V	N	k		CH: Weiß et al. (1998)
Anelasmococephalus hadzii Martens, 1978		m	m		
Anelasmococephalus rufitarsis Simon, 1879		N			CH: Martens & Chemini (1988)
Ischyropsalididae					
Ischyropsalis helvetica Roewer, 1916		m	m		
Ischyropsalis kollari C.L. Koch, 1839			m		
Ischyropsalis hadzii Roewer, 1950			m		
Ischyropsalis carli Lessert, 1905	V	m	m		
Ischyropsalis hellwigi hellwigi (Panzer, 1794)	V		m		
Phalangiidae					
Opilio dinaricus Silhavy, 1938			m		
Mitopus glacialis (Heer, 1845)	N	m	m		D: Muster (1999)
Mitopus morio (Fabricius, 1799)	V	m	m		
Nelima apenninica Martens, 1969			m		
Nelima doriae (Canestrini, 1871)	N			von Tedeschi & Sciaky (1996) neu für die CH gemeldet, da der Nachweis von Lessert (1917) nicht bei Martens (1978) enthalten ist	CH: Lessert (1917)
Nelima gothica Lohmander, 1945	V				
Nelima semproni Szalay, 1951	V		m		
Nelima silvatica (Simon, 1879)	V				
Odiellus coronatus (Roewer, 1911)			m		
Odiellus spinosus (Bosc, 1792)	V	m			
Oligolophus hansenii (Kraepelin, 1896)	V			O. hansenii	
Rilaena triangularis (Herbst, 1799)	V	m	m		
Opilio canestrinii (Thorell, 1876)	V	m	k	O. ravennae auct.	
Opilio parietinus (De Geer, 1778)	V	m	m	Nachweis in der CH nach Martens (1978) unsicher	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Opilio ruzickai</i> Silhavy, 1938				m	
<i>Opilio saxatilis</i> C.L. Koch, 1839	V	m	m		
<i>Paroligolophus agrestis</i> (Meade, 1855)	V				
<i>Phalangium opilio</i> Linnaeus, 1758	V	m	m		
<i>Platybunus bucephalus</i> (C.L. Koch, 1835)	V	m	m		
<i>Platybunus pinetorum</i> (C.L. Koch, 1839)	V	m	m		
<i>Megabunus rhinoceros</i> (Canestrini, 1872)				m	
<i>Leiobunum limbatum</i> L. Koch, 1861	V	m	m		
<i>Oligolophus tridens</i> (C.L. Koch, 1836)	V	m	m		
<i>Egaenus convexus</i> (C.L. Koch, 1835)				m	
<i>Amilenus aurantiacus</i> (Simon, 1881)	V	m	m		
<i>Astrobunus bernardinus</i> Simon, 1879				m	
<i>Astrobunus helleri</i> (Ausserer, 1867)				m	
<i>Astrobunus laevipes</i> (Canestrini, 1872)	V			m	
<i>Dasylobus graniferus</i> (Canestrini, 1871)				m m	<i>Eudasylobus nicaeensis</i>
<i>Leiobunum rotundum</i> (Latreille, 1798)	V	m	m		
<i>Dicranopalpus gasteinensis</i> Doleschall, 1852	V	m	m		
<i>Megabunus lesserti</i> Schenkel, 1927	V	m	m		
<i>Gyas annulatus</i> (Olivier, 1791)	V			m	
<i>Gyas titanus</i> Simon, 1879	V	m	m		
<i>Homalenotus quadridentatus</i> (Cuvier, 1795)				m	
<i>Lophopilio palpinalis</i> (Herbst, 1799)	V	m	m		
<i>Lacinius ephippiatus</i> (C.L. Koch, 1835)	V	m	m		
<i>Lacinius horridus</i> (Panzer, 1794)	V	m	m		
<i>Leiobunum blackwalli</i> Meade, 1861	V	m			
<i>Leiobunum roseum</i> C.L. Koch, 1839				m	
<i>Leiobunum rupestre</i> (Herbst, 1799)	V	m	m		
<i>Leiobunum subalpinum</i> Komposch, 1998				k	s.a. Komposch (1998)
<i>Lacinius dentiger</i> (C.L. Koch, 1848)	V			m	
<i>Megabunus armatus</i> (Kulczynski, 1887)				m	

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Dasylobus ligusticus (Roewer, 1923)		m		Eudasylobus l.	
Pseudoscorpiones					
Chthoniidae					
Mundochthonius styriacus Beier, 1971	V	h	h		
Chthonius (Ephippiochthonius) austriacus Beier, 1931	V		h	C. fuscimanus auct.	
Chthonius (Ephippiochthonius) parmensis Beier, 1963	V	N	N		A & CH: Drogla (1990)
Chthonius (Ephippiochthonius) poeninus Mahnert, 1979			h		
Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (Preyssler, 1790)	V	h	h		
Chthonius (Ephippiochthonius) tuberculatus Hadzi, 1937	V				
Mundochthonius alpinus Beier, 1947			h		
Chthonius (Chthonius) submontanus Beier, 1963	V		h		
Chthonius (Chthonius) tenuis L. Koch, 1873	V	h	h		
Chthonius (Globochthonius) globifer Simon, 1879			h		
Chthonius (Chthonius) ellingseni Beier, 1928			h		
Chthonius (Ephippiochthonius) nidicola Mahnert, 1979			h		
Chthonius (Chthonius) ressli Beier, 1956			h		
Chthonius (Chthonius) diophthalmus Daday, 1888	V				
Chthonius (Chthonius) ischnocheles (Hermann, 1804)	V	h	h		
Chthonius (Chthonius) jugorum Beier, 1952			h		
Chthonius (Chthonius) orthodactylus (Leach, 1817)	V		h		
Chthonius (Chthonius) pusillus Beier, 1947			h		
Chthonius (Chthonius) pygmaeus Beier, 1934			h		
Chthonius (Chthonius) pygmaeus carinthiacus Beier, 1951			h		
Chthonius (Chthonius) alpicola Beier, 1951			h		
Neobisiidae					
Roncus julianus Caporiacco, 1949			h		
Neobisium (Neobisium) simile (L. Koch, 1873)	V	h	h		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
<i>Neobisium (Neobisium) jugorum</i> (L. Koch, 1873)			h	h	
<i>Neobisium (Neobisium) minimum</i> Beier, 1928				h	
<i>Neobisium (Neobisium) noricum</i> Beier, 1939				h	
<i>Neobisium (Neobisium) schenkeli</i> (Strand, 1932)			h		
<i>Neobisium (Neobisium) simoni</i> (L. Koch, 1873)	V	h	h		
<i>Neobisium (Neobisium) simoni petzi</i> Beier, 1939				h	
<i>Neobisium (Neobisium) strausaki</i> Vachon, 1966			h		
<i>Neobisium (Neobisium) sylvaticum</i> (C.L. Koch, 1835)	V	h	h		
<i>Neobisium (Neobisium) hermanni</i> Beier, 1938				h	
<i>Roncus carinthiacus</i> Beier, 1934				h	
<i>Neobisium (Neobisium) dolicodactylum</i> (Canestrini, 1874)			h		
<i>Roncus alpinus</i> L. Koch, 1873			h	h	
<i>Neobisium (Neobisium) crassifemoratum</i> (Beier, 1928)	V				
<i>Microbisium brevifemoratum</i> (Ellingsen, 1903)	V	h	h		
<i>Microbisium sueicum</i> Lohmander, 1945	V	h	h		
<i>Neobisium (Blothrus) aueri</i> Beier, 1962				h	
<i>Neobisium (Neobisium) aelleni</i> Vachon, 1976			h		
<i>Neobisium (Neobisium) erythrodactylum</i> (L. Koch, 1873)	V		h		
<i>Neobisium (Neobisium) carinthiacum</i> Beier, 1939				h	
<i>Neobisium (Neobisium) helveticum</i> Heurtault, 1971			h		
<i>Neobisium (Neobisium) doderoi</i> (Simon, 1896)			h	h	
<i>Roncus lubricus lubricus</i> L. Koch, 1873	V	h	h		Status nach Curcic et al. (1992); R. "lubricus" aus D mittlerweile als "s. str." erkannt (s.a. Drogla & Blick 1998)
<i>Neobisium (Neobisium) dolomitium</i> Beier, 1952	V		h		
<i>Neobisium (Neobisium) fuscimanum</i> (C.L. Koch, 1843)	V		h		
<i>Neobisium (Neobisium) galeatum</i> Beier, 1953				h	
<i>Neobisium (Neobisium) gineti</i> Vachon, 1966			h		
<i>Neobisium (Neobisium) carcinoides</i> (Hermann, 1804)	V	h	h		N. nemorale

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Syarinidae					
<i>Syarinus strandi</i> (Ellingsen, 1901)	V			h	
<i>Pseudoblothrus strinatii</i> Vachon, 1954				h	
<i>Pseudoblothrus thiebaudi</i> Vachon, 1969				h	
Larcidae					
<i>Larca lata</i> (H.J. Hansen, 1884)	V			h	
Cheiridiidae					
<i>Apocheiridium</i> (<i>Apocheiridium</i>) <i>ferum</i> (Simon, 1879)	V	h		h	
<i>Cheiridium</i> <i>museorum</i> (Leach, 1817)	V	h		h	
Geogarypidae					
<i>Geogarypus minor</i> (L. Koch, 1873)				h	
Withiidae					
<i>Withius hispanus</i> (L. Koch, 1873)				h	
<i>Withius piger</i> (Simon, 1878)	V	h		h	
Cheliferidae					
<i>Hystrochelifer tuberculatus</i> (Lucas, 1849)				h	
<i>Mesochelifer ressli</i> Mahnert, 1981	V	h		h	
<i>Dactylochelifer latreillei</i> (Leach, 1817)	V	h		h	
<i>Chelifer cancroides</i> (Linnaeus, 1758)	V	h		h	
<i>Rhacochelifer peculiaris</i> (L. Koch, 1873)				h	
Chernetidae					
<i>Chernes hahnii</i> (C.L. Koch, 1839)	V	h	h		C. hahni
<i>Pselaphochernes dubius</i> (O. P.-Cambridge, 1892)	V				
<i>Lasiochernes pilosus</i> (Ellingsen, 1910)	V			h	
<i>Lamprochernes nodosus</i> (Schrank, 1803)	V	h	h		

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Lamprochernes chyzeri (Tömösváry, 1882)	V	h	h	1862 (lapsus)	
Dinocheirus panzeri (C.L. Koch, 1837)	V	h	h		
Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873)	V		h		
Pselaphochernes scorpioides (Hermann, 1804)	V	h	h		
Chernes vicinus (Beier, 1932)	V		h		
Chernes montigenus (Simon, 1879)			h	h	
Chernes cimicoides (Fabricius, 1793)	V		h		
Chernes beieri Harvey, 1990	V				
Anthrenochernes stellae Lohmander, 1939	V				
Allochernes wideri (C.L. Koch, 1843)	V	h	h		
Allochernes powelli (Kew, 1916)	V		h		
Allochernes peregrinus Lohmander, 1939	V		h		
Chernes similis Beier, 1932				h	
Chernes nigrimanus (Ellingsen, 1897)	V	h	h		

Atemnidae

Atemnus politus (Simon, 1878)	h	h
-------------------------------	---	---

Scorpiones

Euscorpiidae

Euscorpius italicus (Herbst, 1800)	f		
Euscorpius germanus germanus (C.L. Koch, 1837)	f	f	
Euscorpius germanus alpha Caporiacco, 1950	f		
Euscorpius gamma Caporiacco, 1950	N	E. mingrelicus gamma, E. germanus "Karawankenform", Status nach Komposch & Scherabon (1999)	A: Komposch & Scherabon (1999)
Euscorpius carpathicus (Linnaeus, 1767)	f		

Palpigradi

	D	CH	A	abweichend	Zitat
Eukoeneniidae					
<i>Eukoenia austriaca stinyi</i> (Strouhal, 1936)				C	
<i>Eukoenia austriaca styriaca</i> Condé & Neuhertz, 1977				C	
<i>Eukoenia spelaea strouhali</i> Condé, 1972				C	